

# La dosificación mixta está autorizada para los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19.



Serie inicial	Pfizer	Moderna	Johnson & Johnson*
<b>Cuando</b>	5 meses o más después de completar la primer dosis	6 meses o más después de completar la primer dosis	2 meses o más después de completar la única dosis
<b>Quien</b>	Todas las personas de 12 años o mayores	Todas las personas de 18 años o mayores	Todas las personas de 18 años o mayores
<b>Opciones de refuerzo</b>	Pfizer, media dosis de Moderna o Johnson & Johnson	Pfizer, media dosis de Moderna o Johnson & Johnson	Pfizer, media dosis de Moderna o Johnson & Johnson

\* Discuta los riesgos y beneficios con un proveedor de atención médica.

## Tercera dosis

- Las personas con un sistema inmunológico moderado o grave son más vulnerables al COVID-19. Es posible que no desarrollen el mismo nivel de inmunidad con la serie de vacunas de 2 dosis, en comparación con las personas que no están inmunodeprimidas. [in.gov/isdh](https://www.in.gov/isdh)
- Los CDC recomiendan que las personas con sistemas inmunitarios de moderado a gravemente comprometidos reciban una dosis adicional de la misma vacuna de ARNm COVID-19 al menos 28 días después de una segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 o la vacuna Moderna COVID-19.
- Esta dosis adicional ayuda a mejorar los resultados de su primer dosis de vacuna, especialmente las personas inmunodeprimidas.
- Una persona inmunodeprimida que recibió Pfizer o Moderna puede recibir una dosis de refuerzo. Aquellos que recibieron Johnson & Johnson pueden recibir la dosis de refuerzo de cualquier tipo de vacuna 2 meses después de la primer dosis de Johnson & Johnson.